


«Утверждаю»

Проректор по научной работе
Федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения «Санкт–Петербургский
государственный педиатрический
медицинский университет»

Министерства здравоохранения
Российской Федерации, доктор
медицинских наук, профессор

Насыров Р.А.



ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

о научно–практической ценности диссертационной работы Шова Натальи Игоревны «Факторы риска формирования суицидального поведения больных эпилепсией (клинические и диагностические аспекты)», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям: 14.01.06 – психиатрия, 3.1.24.–неврология.

Актуальность темы выполненной работы

Актуальность темы определяется тем, что распространенность эпилепсии и связанных с этим заболеванием непсихотических и психотических психических и поведенческих нарушений в популяции чрезвычайно высока, с этим коррелирует высокая распространенность

завершенных суицидов среди данных больных; что создает определенный трудности в верификации и превенции этих расстройств.

В настоящее время, благодаря сложившему представлению о процессах эпилептогенеза, эпилепсия рассматривается в ряду неврологических заболеваний. В результате таких изменений произошел заметный прогресс в изучении и понимании неврологических аспектов заболевания и поиске новых возможностей достижения контроля над припадками, но, при этом, практически игнорировалась психиатрическая составляющая эпилепсии. Многочисленные исследования показали, что суицидальные намерения могут быть как у пациентов, находящихся в процессе лечения, так и в ремиссии припадков. Особое внимание уделяется не только биологическим аспектам заболевания, но и психологическим, патопсихологическим, социальным, семейным, экономическим факторам, что значительно ухудшает качество жизни и снижает потенциал социальной адаптации пациентов.

Недостаточная изученность суицидального поведения при эпилепсии требует комплексного научного подхода на стыке двух специальностей – психиатрии и неврологии.

Несмотря на явные успехи в лечении пароксизмального синдрома в связи с появлением новейших антиэпилептических препаратов, методов нейромодуляции, совершенствования оперативного лечения, заметного снижения частоты психических нарушений не отмечено. Более того, суицид является 3 причиной смерти в группе больных эпилепсией, с наибольшей частотой распределения в молодом возрасте от 20 до 30 лет. За последнее время появилось множество исследований посвященных влиянию антиэпилептических препаратов на формирование суицидальных намерений. Стоит отметить, что уже в период начала заболевания и верификации диагноза риск суицидальности увеличивается, ввиду нейропсихологического дефицита и соответствующих психических нарушений, которые могут предшествовать «неврологическому» дебюту заболевания. На данный

момент практически отсутствуют исследования посвященные стигматизации и фрустрации больных эпилепсией. Все это ставит перед исследователем задачи дальнейшего более глубокого изучения этиопатогенеза, коморбидных психических расстройств при эпилепсии, оценки клинических и патопсихологических факторов, семейных и социальных аспектов заболевания, определения витальных и антивитальных факторов с целью разработки стратегий первичной превенции формирования суицидального поведения.

В связи с вышесказанным, диссертационная работа Н.И. Шова, содержащая целостное решение поставленных задач, является важной и актуальной.

Новизна исследования и полученных результатов

Работа является современной и выполнена с учетом биопсихосоциального подхода, позволяющая охватить весь спектр клинических, психологических, социальных факторов, влияющих на формирование и проявление суицидального поведения у больных эпилепсией.

Впервые на репрезентативной выборке произведено комплексное исследование по выявлению факторов риска формирования суицидального поведения у больных эпилепсией. Получены данные о достоверных различиях в социальных, клинических и психологических характеристиках больных эпилепсией, также определена взаимосвязь просуицидогенных факторов. Впервые у данной категории пациентов подробно исследован суицидологический анамнез, оценены основные параметры суицидального поведения (тип, планируемый способ самоубийства, мотивы, причины, запускающие факторы), выраженность суицидальных тенденций. Установлены определенные различия в выраженности антисуицидальных факторов, а также их значимость в профилактике суицидального поведения.

Степень достоверности результатов исследования

Достоверность результатов, выводов и практических рекомендаций обеспечена точной постановкой цели и задач исследования, включением достаточного клинического материала, использованием современных методов психодиагностики направленные на различные сферы психики больного эпилепсией, включая шкалы и опросники диагностики степени суицидального риска и причин для жизни.

В ходе исследования все поставленные задачи были успешно решены автором, тщательно проанализированы результаты многомерных исследований. Использование корреляционного анализа позволило выявить определённые взаимосвязи между определенными факторами, что создает предпосылки для дальнейшей разработки проблемы и построение патопсихологической модели суицидального поведения у больных эпилепсией. Статистическая обработка проводилась с использованием современного программного обеспечения при корректной оценке результатов, что обеспечило высокую достоверность полученных данных.

Представленный анализ и заключение с оценкой результатов собственного исследования логичны и обоснованы. Выводы и практические рекомендации содержат в себе основные результаты исследования.

Диссертация выполнена в традиционном стиле. Работа содержит введение, 4 главы, клинические примеры, выводы, практические рекомендации, список литературы, приложения. Во введении обоснованы актуальность темы, цель и задачи исследования, научная новизна и практическая значимость. Материал подробно изложен на 248 страницах машинописного текста. Диссертация иллюстрирована 58 таблицами и 18 рисунками, которые наглядно отображают полученные результаты. Список литературы включает 219 источников, в том числе 76 отечественных и 143 иностранных. В главе «Обсуждение полученных результатов» автор обсуждает полученные данные. Рекомендации аргументированы, соответствуют цели и задачам исследования.

Значимость для науки и практики полученных результатов

Результаты, полученные автором, сформулированные на их основе выводы и практические рекомендации могут быть использованы специалистами как в условиях стационара, так и амбулаторно для улучшения диагностики и лечения больных эпилепсией.

Целесообразно внедрение разработанных практических рекомендаций среди врачей, работающих с данным контингентом больных. На этапе восстановительного лечения необходимо целенаправленно выявлять имеющиеся у пациентов симптомы непсихотических психических расстройств с использованием специальных психометрических шкал, нейропсихологического тестирования. При верификации указанных расстройств, в частности депрессивного, следует проводить коррекцию антиэпилептической терапии.

Результаты исследований используются при проведении лечебно-профилактической работы, а также в циклах учебного центра ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» и различных курационных мероприятиях в медицинских учреждениях Северо – Западного федерального округа.

Основные результаты исследования Шова Н.И. опубликованы в научных изданиях, материалы диссертационной работы достаточно полно изложены в 24 печатных работах, из них в изданиях, рекомендованных перечнем ВАК РФ – 9. Автореферат диссертации построен по традиционной схеме, отражает основное содержание диссертации и научных публикаций.

Замечания, вопросы

Принципиальных замечаний к диссертационной работе нет.

В целом положительно оценивая работу, в порядке дискуссии хотелось бы получить от диссертанта ответы на следующие вопросы:

2. Отличалась ли выраженность суицидального риска у больных эпилепсией в зависимости от локализации эпилептогенного очага?

3. Как вы можете объяснить, что по мере увеличения длительности заболевания происходит усиление антисуицидальных установок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация Шова Натальи Игоревны на тему: «Факторы риска формирования суицидального поведения больных эпилепсией (клинические и диагностические аспекты)», является научно – квалификационной работой, которая содержит решение актуальной научной задачи по первичной профилактики суицидального поведения у больных эпилепсией.

По актуальности данной проблемы, объему выполненных исследований, глубине анализа полученных данных, доказательной научной и практической ценности выводов и практических рекомендаций диссертации Н.И. Шова «Факторы риска формирования суицидального поведения больных эпилепсией (клинические и диагностические аспекты)» полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», от 24.09.2013 г. № 842 (с изменениями от 26.05.2020 г. № 751) утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения искомой степени по специальности: 14.01.06 – психиатрия, 14.01.11 – нервные болезни.

Отзыв обсужден и одобрен на совместном заседании кафедры психиатрии и наркологии и кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России(протокол №1 от «12» января 2022 г.).

Заведующий кафедрой психиатрии и наркологии
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Санкт–Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, д.м.н. по специальностям 14.01.06. – психиатрия,
14.01.27. – наркология, доцент
Гречаный Северин Вячеславович



Заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской
генетики Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Санкт–Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, д.м.н. по специальности 3.1.24. – неврология,
профессор

Гузева Валентина Ивановна



Почтовый адрес: 194100, Российская Федерация, г. Санкт–Петербург, ул.
Литовская д.2, Телефон: 8(812)542–39–83

Адрес электронной почты: spb@gpmu.ru

